





IBD:tä sairastavien kokemuksia hoitopolusta



Tutkimus

IBD:tä sairastavien kokemus selvitys toteutettiin kvantitatiivisena verkkokyselynä marras-joulukuussa 2020. Kyselyn toteutuksesta vastasi Nordic Health Group. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä IBD ja muut suolistosairaudet ry:n ja lääkeyritys Janssen Finlandin kanssa.

Kyselyyn osallistui 1136 suomalaista IBD:tä sairastavaa henkilöä.





- **Diagnoosi** • Colitis ulcerosa **59,3 %** • Crohnin tauti **33,6 %**
- Välimuotoinen koliitti **3,9 %** • Muu suolistosairaus **3,1 %**
- En osaa sanoa **0,1 %**



**Noin
neljänneksellä
vastaajista IBD
haittaa elämää
jatkuvasti tai usein.**


Uupumusta kokee lähes puolet

Uupumus vaikuttaa olevan hieman yleisempää nuorempien vastaajien keskuudessa.



Unettomuus kuormittaa arkea

Lähes 45 %:lla vastaajista on unettomuutta tai yöllisiä heräämisiä usein tai jatkuvasti.



Lähes puolet kertoo kokeneensa uupumusta jatkuvasti tai usein.




Kipujen kanssa elää lähes neljännes vastaajista

Kipu on naisilla yleisempää kuin miehillä.

Kipu on suhteellisesti yleisempää nuoremmilla.


Hiljattain diagnosoiduilla hieman enemmän kipua keskimäärin.



**Hoitopolun
sujuvuudessa
on edelleen
kehitettävää.**

Useat vastaajat kokevat saaneensa diagnoosin viiveellä

Lähes 40 % vastaajista kokee, että diagnosoinnissa on ollut hitautta.




Diagnoosin jälkeen hoidon aloittaminen on hyvällä tasolla



Vain noin joka **10.** vastaajista katsoo, ettei hoitoa aloitettu kohtuullisessa ajassa diagnoosin jälkeen.



Hoitoyksiköstä saatuun hoitoon ollaan tyytyväisiä



Kyselyn mukaan perusterveydenhuollossa noin **75 %** potilaista on tyytyväinen hoitoonsa. Keskussairaaloissa tyytyväisiä on **91 %** ja yliopistollisissa sairaaloissa **92 %**.



Biologisia lääkkeitä käyttävät olivat keskimäärin tyytyväisempiä hoitoon (**86 %**) kuin muita lääkkeitä käyttävät (**73 %**).




Viidesosalle on epäselvää, miten hoito jatkuu



Epätietoisuutta
tulevaisuuden
hoidosta esiintyy
eniten nuorimmissa
vastaajissa (**25 %**).





Neljä viidestä suhtautuu hoidon tulevaisuuteen luottavaisesti



Epäluottamusta esiintyy enemmän nuoremmilla IBD:tä sairastavilla (23 %) kuin 40—60-vuotiailla tai sitä iäkkäämmillä.



Käytettävät lääkehoidot koetaan hyödyllisiksi




Koetko, että käytössäsi oleva lääkehoito on hyödyllinen sairautesi hoidossa?

Yli 10 vuotta sairastaneet olivat keskimäärin tyytyväisempiä lääkehoidon hyödyllisyyteen.

Nykyistä lääkitystä hyödyttömänä pitävien osuus on nuoremmilla suurempi kuin vanhemmilla.

Biologisten lääkkeiden käyttäjissä suhteellinen tyytyväisten osuus on hieman suurempi kuin muiden lääkkeiden käyttäjissä.





10

CP-229905